



## Gravidanza e parto in risposta all' emergenza COVID19.

Indicazione per la richiesta dei test Molecolari ed Antigenici per la Partoriente, Accompagnatori, Ricoveri e Prestazioni Ambulatoriali

| Data Emissione | Elaborazione a cura  | Approvazione Clinica  |
|----------------|--|---|
| 15/02/2021     | <b>Dott. Gianfranco Scarpelli</b><br>Direttore<br>UOC Neonatologia e TIN           | <b>Dott. Franco Cesario</b><br>Covid Manager<br>AO Annunziata Cosenza |
|                | <b>Prof. M. Morelli</b><br>Direttore<br>UOC Ginecologia ed Ostetricia              | <b>Dott.F.Rose</b><br>Direttore Medico f.f. PU                        |
|                | <b>Dott.ssa Francesca Greco</b><br>Direttore f.f.<br>UOC Microbiologia e Virologia |   |
|                | <b>Dott. Maria Addolorata Vantaggiato</b><br>Responsabile                          |   |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <b>UOSD</b><br><b>Rischio Clinico</b>   |  |
|  | <b>Dott. Franco Cesario</b><br><b>Covid Manager</b><br><b>AO Annunziata Cosenza</b> |  |

**Cosenza, 15 febbraio 2021**

**Oggetto:** Area Materno-Infantile

***Indicazioni per gravidanza e parto in risposta all' emergenza COVID19.***

***Ricoveri in pediatria, chirurgia pediatrica.***

Dall'inizio della pandemia, per rispondere alle emergenti esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale in area materno-infantile, si è resa necessaria una revisione dei percorsi di presa in carico delle donne in gravidanza, delle madri, dei padri e dei neonati. A tale scopo si precisano alcune procedure. Premesso che il personale sanitario, i pazienti, gli accompagnatori devono rispettare con la massima attenzione le misure igieniche quali, distanziamento interpersonale, uso corretto della mascherina chirurgica, igiene delle mani, tenuto conto delle urgenze e della disponibilità di differenti saggi diagnostici per SarsCov2 , si precisa quanto segue.

## **Indicazione per la Partoriente**

**Al ricovero:** tutte le donne che afferiscono per il parto all'Accettazione dell'UOC di Ostetricia e Ginecologia verranno sottoposte, all' ingresso, al test molecolare per SarS-Cov2 .

Qualora insorga una situazione clinica **emergenziale per la quale è necessario disporre nell'immediato del Test** viene eseguito un "test antigenico rapido" (mediante tampone nasale a secco) che presenta dati di specificità sovrapponibili al test molecolare anche se con sensibilità ridotta. Nel contempo verranno mantenute tutte le misure igieniche, la paziente sarà ricoverata in un'area grigia, contestualmente sarà richiesto un test molecolare di conferma. Acquisito il risultato la paziente potrà essere ricoverata in degenza ordinaria.

Dalle 23,00 alle 8,00, poiché l'esecuzione del saggio molecolare implica un tempo di circa 3 ore ( chiamata in reperibilità, effettuazione del saggio diagnostico, attesa risultato) potrà essere eseguito un test Antigenico rapido con le stesse modalità sopra indicate. Il saggio molecolare verrà richiesto nella mattina successiva, precisando che la paziente sarà collocata in area grigia e ricoverato in degenza sino all' acquisizione del risultato molecolare.

Per tutte le situazioni cliniche **critiche** che insorgono dalle 23,00 alle 8,00, ad esempio taglio cesareo, indisponibilità di area di ricovero etc, si deve richiedere il saggio molecolare nel rispetto della tempistica indicata.

## **Indicazioni per chi assiste la partoriente**

Alle donne deve essere garantita la presenza di una persona di propria scelta durante il travaglio, il parto e la degenza a sostegno di una migliore esperienza della nascita.

Gli accompagnatori prescelti non devono avere avuto segni e sintomi suggestivi di COVID-19 nei 7 giorni precedenti, quali febbre, tosse persistente, congestione e secrezione nasale, difficoltà respiratoria, mal di gola .

Comunque chi rimane a supporto della Donna Gravida deve sottoscrivere **Autodichiarazione**.

**Assolutamente obbligatorio l'uso dei dispositivi, DPI**

### **Parto naturale. Travaglio/parto naturale**

E' consentito al papà/familiare di assistere al travaglio di parto previa l'esibizione di un test Antigenico rapido, effettuato entro le 48 h; qualora il soggetto non disporrà di tale referto, sarà effettuato dall' UOC di Ostetricia e Ginecologia.

Non è consentito al familiare di rimanere in ospedale dopo il parto.

### **Parto Cesareo**

Dopo il taglio cesareo il familiare può rimanere a supporto della donna nelle 24h successive e in tutti i casi in cui le particolari condizioni cliniche della Donna lo richiedano, previa l'esecuzione del Saggio Molecolare Sars-Cov-2, che sarà eseguito dall' UOC di Ginecologia ed Ostetricia.

Una volta accolto, l'accompagnatore deve ricevere istruzioni chiare sulla necessità di rimanere a fianco della donna senza spostarsi all' interno del reparto rispettando tutte le misure preventive richieste ( corretto uso dei DPI etc)

### **Prestazioni ambulatoriali**

Le prestazioni ambulatoriali a carico dei neonati o bambini possono essere eseguite con la presenza della madre e del padre previa sottoscrizione di autodichiarazione nel reparto di competenza dagli stessi. **Assolutamente obbligatorio l'uso dei dispositivi, DPI**

### **UOC di Pediatria e Chirurgia Pediatrica: ricoveri**

Ai familiari accompagnatori di minori verrà eseguito un test molecolare Sars-Cov-2 prima del ricovero, a carico delle UOC, raccomandando l'aderenza alle misure igieniche, senza spostarsi all'interno del reparto rispettando tutte le misure preventive richieste ( corretto uso dei DPI etc).